

05

WILDKUNDE

Jagdausbildung BEJV
Formation de chasse FCB



5.2 Haarwild Kategorie 2

Lernziel: 5.2.2.1-9
Hermelin

Hermelin

Zoologische Zuordnung

Ordnung:	Raubtiere
Unterordnung:	Landraubtiere
Familie:	Marderartige
Tierart:	Hermelin (<i>Mustela erminea</i>)



Hermelin

Unterschiedliche Färbung
in Sommer und Winter



Hermelin im Winterhaar



Hermelin im Sommerhaar


Hermelin

- Länge: 27 - 40 cm; Schwanz zusätzl. 17 – 20 cm
- Gewicht: 100 - 450 g
- Geschützte Art
- Stets schwarze Schwanzquaste
- Winterfärbung weiss!
- Vorkommen: Flachland bis ins Gebirge
- Lebensraum: Wiesen, Gebüsche, Steinhaufen, meidet Wälder
- Reiner Fleischfresser: v.a. Mäuse
- Ranz: April- Juli
- Tragzeit: ca. 11 Monate, davon 10 Monate Eiruhe!



Losung


Oft an erhöhten Stellen deponiert (Reviermarkierung)



Hermelin

Unterschiede zum ähnlichen Mauswiesel

- Schwarze Schwanzspitze
- Deutlich grösser
- Mauswiesel färbt im Winter in Mitteleuropa nur äusserst selten um




Tritt und Spur

Großes Wiesel




A



Kleines Wiesel



B




Grosses Wiesel
Kleines Wiesel

= Hermelin
= Mauswiesel

Hermelin

Natürliche Feinde: Natürlich vorkommende Fressfeinde






Hermelin 1

Frage

Wie unterscheiden sich Hermelin und Mauswiesel?

Antwort



Hermelin 2

Frage

Ist die Hermelin jagdbar?

Antwort